

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Colocynthis Pentarkan®

Mischung

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach Anwendung dieses Arzneimittels nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Colocynthis Pentarkan® und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Colocynthis Pentarkan® beachten?
3. Wie ist Colocynthis Pentarkan® anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Colocynthis Pentarkan® aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Colocynthis Pentarkan® und wofür wird es angewendet?

Colocynthis Pentarkan® ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Anwendung bei Erkrankungen der Verdauungsorgane.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Magen-Darm-Krämpfe.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Colocynthis Pentarkan® beachten?

Colocynthis Pentarkan® darf nicht angewendet werden:

- bei Erkrankungen mit erhöhtem Augeninnendruck (Glaukom oder "Grüner Star") und atonischen Blasenentleerungsstörungen, z. B. bei einer gutartigen Vergrößerung der Prostata.
- bei Kindern unter 12 Jahren.
- in der Schwangerschaft und Stillzeit.
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe von Colocynthis Pentarkan® sind.
- bei Alkoholkranken.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Colocynthis Pentarkan® ist erforderlich:

Vor Behandlungsbeginn sollten die Ursachen der Erkrankung möglichst weitgehend abgeklärt werden. Bei länger als 1-2 Tage anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Behandlung bedürfen.

Wegen des Alkoholgehaltes soll Colocyntis Pentarkan® bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Bei Anwendung von Colocyntis Pentarkan® mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher keine bekannt.

Bei Anwendung von Colocyntis Pentarkan® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Das Präparat darf aufgrund der Bestandteile Colocyntis und Atropinum sulfuricum in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Colocyntis Pentarkan®

Enthält 57 Vol.-% Alkohol.

3. Wie ist Colocyntis Pentarkan® anzuwenden?

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre sollten 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Hinweis: Für die korrekte Dosierung Flasche zum Tropfen senkrecht halten.

Sie sollten die Tropfen eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen einnehmen und sie vorzugsweise vor dem Schlucken einige Zeit im Mund behalten. Bei Bedarf können die Tropfen vor der Einnahme in etwas Wasser verdünnt werden.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge Colocyntis Pentarkan® angewendet haben, als Sie sollten

Bei Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es wegen des enthaltenen Atropins insbesondere bei Kindern zu Vergiftungserscheinungen mit Beschleunigung des Herzschlages, Wärmestau (Fieber), weiten Pupillen und Mundtrockenheit sowie Unruhe- und Erregungszuständen kommen. In diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

Wenn Sie die Anwendung von Colocyntis Pentarkan® vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Colocyntis Pentarkan® abbrechen

Es sind keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Anwendung von Colocyntis Pentarkan® abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Colocynthis Pentarkan® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen sind bisher keine bekannt.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Colocynthis Pentarkan® aufzubewahren?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Colocynthis Pentarkan® enthält

Die Wirkstoffe sind: Colocynthis Dil. D3 1,0 g, Atropinum sulfuricum Dil. D3 1,0 g, Dioscorea villosa Dil. D1 1,0 g, Momordica balsamina Dil. D2 1,0 g, Stannum metallicum Dil. D6 0,1 g in 10 g (entsprechend 10,9 ml) Mischung.

Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol 94% (m/m), Gereinigtes Wasser.

1 ml entspricht 33 Tropfen.

Wie Colocynthis Pentarkan® aussieht und Inhalt der Packung

Colocynthis Pentarkan® ist eine farblose bis schwach gelbe Flüssigkeit zum Einnehmen.

Packung mit 50 ml Mischung

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24
76227 Karlsruhe
info@dhu.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2015.

Colocynthis Pentarkan® enthält die homöopathischen Einzelmittel Colocynthis (Koloquinte), Atropinum sulfuricum (Salz eines Alkaloids der Tollkirsche), Dioscorea villosa (Yamswurzel), Momordica balsamina (Balsamapfel) und Stannum metallicum (Zinn). Die Bestandteile ergänzen sich in ihrer Wirkung zur Behandlung von Magen-Darm-Störungen, die vor allem durch krampfartige, periodisch auftretende Leibschmerzen gekennzeichnet sind und von Übelkeit und Blähungen begleitet sein können.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6568315.00.00