

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Indomet-Dotopharma Gel

10 mg/g

Indometacin

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist *Indomet-Dotopharma Gel* und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von *Indomet-Dotopharma Gel* beachten?
3. Wie ist *Indomet-Dotopharma Gel* anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Indomet-Dotopharma Gel* aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist *Indomet-Dotopharma Gel* und wofür wird es angewendet?

Was ist *Indomet-Dotopharma Gel*?

Indomet-Dotopharma Gel ist ein schmerzlinderndes und entzündungshemmendes Arzneimittel.

Wofür wird *Indomet-Dotopharma Gel* angewendet?

Indomet-Dotopharma Gel wird angewendet bei:

- degenerativen Gelenkerkrankungen (ausgenommen degenerative Erkrankungen des Hüftgelenks sowie der kleinen Wirbelgelenke);
- Entzündungen der Sehnen, Sehnenscheiden sowie der umgebenden Gewebe;
- schmerzhafter Schulterversteifung;
- Schwellung und Schmerzen nach Verstauchungen, Prellungen und Zerrungen.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von *Indomet-Dotopharma Gel* beachten?

***Indomet-Dotopharma Gel* darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Indometacin, andere Rheumamittel wie Acetylsalicylsäure oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind;
- auf Hautwunden und offenen Verletzungen.

Augen und Schleimhäute sollten nicht mit dem Gel in Berührung gebracht werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie *Indomet-Dotopharma Gel* anwenden.

Indomet-Dotopharma Gel darf nur auf intakte Hautflächen, nicht auf Hautwunden bzw. offene Verletzungen aufgetragen werden. Augen und Schleimhäute sollten nicht mit dem Präparat in Berührung kommen.

Anwendung von *Indomet-Dotopharma Gel* zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von *Indomet-Dotopharma Gel* sind bisher keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Eine Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit sollte nicht erfolgen.

***Indomet-Dotopharma Gel* enthält Fichtennadelöl**

Dieses Arzneimittel enthält einen Duftstoff mit D-Limonen, Geraniol und Linalool. D-Limonen, Geraniol und Linalool können allergische Reaktionen hervorrufen.

3. Wie ist *Indomet-Dotopharma Gel* anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Das Gel wird mehrmals täglich (gewöhnlich 2- bis 4-mal täglich) auf die betroffenen Körperpartien aufgetragen und eingerieben.

Dauer der Anwendung

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt. Sie richtet sich nach Art, Schwere und Verlauf der Erkrankung.

Art der Anwendung

Das Gel wird dünn auf die Haut über den betroffenen Körperpartien aufgetragen und eingerieben.

Nicht auf Hautwunden und offene Verletzungen auftragen. Augen und Schleimhäute sollten nicht mit dem Gel in Berührung gebracht werden. Nach bestimmungsgemäßigem Gebrauch ist auf Händereinigung zu achten.

Die Anwendung eines luftdichten Verbandes (Okklusivverband) wird nicht empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge von *Indomet-Dotopharma Gel* angewendet haben, als Sie sollten

Sollten Sie übermäßig viel *Indomet-Dotopharma Gel* aufgetragen haben, sollte das Gel wieder entfernt und die Haut mit Wasser abgewaschen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen

Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen):

Sehr selten treten örtlich begrenzte (lokale) Trockenheit oder Brennen der Haut, Wärmegefühl, Juckreiz, Hautrötung oder Ekzem auf. *Indomet-Dotopharma Gel* sollte dann abgesetzt werden. Sehr selten wurde auch eine Verschlimmerung einer vorbestehenden Schuppenflechte (Psoriasis) beobachtet.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist *Indomet-Dotopharma Gel* aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Tube und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C lagern.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was *Indomet-Dotopharma Gel* enthält

- Der Wirkstoff ist Indometacin. 1 g Gel enthält 10 mg Indometacin.
- Die sonstigen Bestandteile sind: 2-Propanol (Ph.Eur.), Diisopropyladipat, Carbomer 980, Trometamol, Fichtennadelöl, Gereinigtes Wasser.

Wie *Indomet-Dotopharma Gel* aussieht und Inhalt der Packung

Indomet-Dotopharma Gel ist in Packungen mit 50 g und 100 g Gel erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Dotopharma UG (haftungsbeschränkt)
Rosenstraße 141
58095 Hagen

Hersteller

Lichtenheldt GmbH
Industriestraße 7-9
23812 Wahlstedt

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2020.

Versionscode: Z09