

Cycelle® 120 Mikrogramm/15 Mikrogramm pro 24 Stunden vaginales Wirkstofffreisetzungssystem

Östrogen/Ethinylestradiol

Wichtige Informationen über kombinierte hormonale Kontrazeptiva (KHK):

• Die korrekte Anwendung zutrifft Sie zu den zuverlässigsten reversiblen Verhütungsmethoden.
• Wenn Sie sich gegen ein Risiko für ein Blutgerinnsel in den Venen und Arterien, insbesondere im ersten Jahr der Anwendung oder bei Wiederaufnahme der Anwendung eines kombinierten hormonalen Kontrazeptivums nach einer Unterbrechung von 4 oder mehr Wochen.

• Lesen Sie bitte auf Packungsbegleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung von Cycelle beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

• Wenn Sie das Folie nicht lesen Sie vielleicht nicht alle Risiken und Nebenwirkungen kennen.
• Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

• Wenn Sie Anzeichen oder Symptome eines Blutgerinnsels und wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen, diese zu haben (siehe Abschnitt 2, „Blutgerinnsel“).

• Achten Sie auf bestimmte Packungsbegleite sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung von Cycelle beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

• Wenn Sie das Folie nicht lesen Sie vielleicht nicht alle Risiken und Nebenwirkungen kennen.
• Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

• Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbegleite angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

• Ihr Arzneimittel ist unter obigen Namen erhältlich, wird in dieser Packungsbegleite jedoch als Cycelle bezeichnet.

Was in dieser Packungsbegleite steht

• Was ist Cycelle und wofür wird es angewendet?

• Was sollten Sie vor der Anwendung von Cycelle beachten?

• Wie ist Cycelle anzuwenden?

• Welche Nebenwirkungen sind möglich?

• Was ist die Zusammensetzung von Cycelle?

• Inhalt der Packung und weitere Informationen

• Weitere Informationen

Die Aushulung eines Blutgerinnsels ist nicht immer tödlich, Sellen kann es zu schwerwiegenden anhaltenden Beschwerden kommen und sehr selten verfallen Blutgerinnsel tödlich.

Es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass das Gesamtrisiko eines gesundheitsschädlichen Blutgerinnsels aufgrund von Cycelle gering ist.

So erkennen Sie ein Blutgerinnsel

Suchen Sie **dringend ärztliche Hilfe**, wenn Sie eines der folgenden Anzeichen oder Symptome bemerken:

Tritt bei Ihnen eines dieser Anzeichen auf?

• Schwellen eines Beins oder längs einer Vene im Bein oder Fuß vor, allem, wenn gleichzeitig Folgendes auftritt:
- Rötung oder Ducturierung im Bein, der möglicherweise nur beim Stehen oder Gehen bemerkbar ist
- Entwässerung des betroffenen Beins
- Schwellung der Haut oberhalb des Beins, 2. aufkommende Bläue, Rot- oder blaue Flecken

• plötzliche unerwartete oder schnelle Atmung

• plötzliche Husten ohne offensichtliche Ursache, bei dem Blut ausgehustet werden kann

• starke Benommenheit oder Schwindelgefühl

• schneller oder unregelmäßiger Herzschlag

• starke Magen Schmerzen

• plötzliche unerwartete oder schnelle Atmung

• plötzliche Husten ohne offensichtliche Ursache, bei dem Blut ausgehustet werden kann

• starke Benommenheit oder Schwindelgefühl

• schneller oder unregelmäßiger Herzschlag

• starke Magen Schmerzen

• plötzliche unerwartete oder schnelle Atmung

• plötzliche Husten ohne offensichtliche Ursache, bei dem Blut ausgehustet werden kann

• starke Benommenheit oder Schwindelgefühl

• schneller oder unregelmäßiger Herzschlag

• starke Magen Schmerzen

• plötzliche unerwartete oder schnelle Atmung

• plötzliche Husten ohne offensichtliche Ursache, bei dem Blut ausgehustet werden kann

• starke Benommenheit oder Schwindelgefühl

• schneller oder unregelmäßiger Herzschlag

• starke Magen Schmerzen

• plötzliche unerwartete oder schnelle Atmung

• plötzliche Husten ohne offensichtliche Ursache, bei dem Blut ausgehustet werden kann

• starke Benommenheit oder Schwindelgefühl

• schneller oder unregelmäßiger Herzschlag

• starke Magen Schmerzen

• plötzliche unerwartete oder schnelle Atmung

• plötzliche Husten ohne offensichtliche Ursache, bei dem Blut ausgehustet werden kann

• starke Benommenheit oder Schwindelgefühl

• schneller oder unregelmäßiger Herzschlag

• starke Magen Schmerzen

• plötzliche unerwartete oder schnelle Atmung

• plötzliche Husten ohne offensichtliche Ursache, bei dem Blut ausgehustet werden kann

• starke Benommenheit oder Schwindelgefühl

• schneller oder unregelmäßiger Herzschlag

• starke Magen Schmerzen

• plötzliche unerwartete oder schnelle Atmung

• plötzliche Husten ohne offensichtliche Ursache, bei dem Blut ausgehustet werden kann

• starke Benommenheit oder Schwindelgefühl

• schneller oder unregelmäßiger Herzschlag

• starke Magen Schmerzen

• plötzliche unerwartete oder schnelle Atmung

• plötzliche Husten ohne offensichtliche Ursache, bei dem Blut ausgehustet werden kann

• starke Benommenheit oder Schwindelgefühl

• schneller oder unregelmäßiger Herzschlag

• starke Magen Schmerzen

• plötzliche unerwartete oder schnelle Atmung

• plötzliche Husten ohne offensichtliche Ursache, bei dem Blut ausgehustet werden kann

• starke Benommenheit oder Schwindelgefühl

• schneller oder unregelmäßiger Herzschlag

• starke Magen Schmerzen

• plötzliche unerwartete oder schnelle Atmung

• plötzliche Husten ohne offensichtliche Ursache, bei dem Blut ausgehustet werden kann

• starke Benommenheit oder Schwindelgefühl

• schneller oder unregelmäßiger Herzschlag

• starke Magen Schmerzen

• plötzliche unerwartete oder schnelle Atmung

• plötzliche Husten ohne offensichtliche Ursache, bei dem Blut ausgehustet werden kann

• starke Benommenheit oder Schwindelgefühl

• schneller oder unregelmäßiger Herzschlag

• starke Magen Schmerzen

• plötzliche unerwartete oder schnelle Atmung

• plötzliche Husten ohne offensichtliche Ursache, bei dem Blut ausgehustet werden kann

• starke Benommenheit oder Schwindelgefühl

• schneller oder unregelmäßiger Herzschlag

• starke Magen Schmerzen

• plötzliche unerwartete oder schnelle Atmung

• plötzliche Husten ohne offensichtliche Ursache, bei dem Blut ausgehustet werden kann

• wenn Sie sich gegen ein Risiko für ein Blutgerinnsel in den Venen und Arterien, insbesondere im ersten Jahr der Anwendung oder bei Wiederaufnahme der Anwendung eines kombinierten hormonalen Kontrazeptivums nach einer Unterbrechung von 4 oder mehr Wochen.

• Lesen Sie bitte auf Packungsbegleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung von Cycelle beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

• Wenn Sie das Folie nicht lesen Sie vielleicht nicht alle Risiken und Nebenwirkungen kennen.
• Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

• Wenn Sie Anzeichen oder Symptome eines Blutgerinnsels und wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen, diese zu haben (siehe Abschnitt 2, „Blutgerinnsel“).

• Achten Sie auf bestimmte Packungsbegleite sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung von Cycelle beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

• Wenn Sie das Folie nicht lesen Sie vielleicht nicht alle Risiken und Nebenwirkungen kennen.
• Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

• Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbegleite angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

• Ihr Arzneimittel ist unter obigen Namen erhältlich, wird in dieser Packungsbegleite jedoch als Cycelle bezeichnet.

• Was ist Cycelle und wofür wird es angewendet?

• Was sollten Sie vor der Anwendung von Cycelle beachten?

• Wie ist Cycelle anzuwenden?

• Welche Nebenwirkungen sind möglich?

• Was ist die Zusammensetzung von Cycelle?

• Inhalt der Packung und weitere Informationen

• wenn Sie sich gegen ein Risiko für ein Blutgerinnsel in den Venen und Arterien, insbesondere im ersten Jahr der Anwendung oder bei Wiederaufnahme der Anwendung eines kombinierten hormonalen Kontrazeptivums nach einer Unterbrechung von 4 oder mehr Wochen.

• Lesen Sie bitte auf Packungsbegleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung von Cycelle beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

• Wenn Sie das Folie nicht lesen Sie vielleicht nicht alle Risiken und Nebenwirkungen kennen.
• Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

• Wenn Sie Anzeichen oder Symptome eines Blutgerinnsels und wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen, diese zu haben (siehe Abschnitt 2, „Blutgerinnsel“).

• Achten Sie auf bestimmte Packungsbegleite sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung von Cycelle beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

• Wenn Sie das Folie nicht lesen Sie vielleicht nicht alle Risiken und Nebenwirkungen kennen.
• Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

• Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbegleite angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

• Ihr Arzneimittel ist unter obigen Namen erhältlich, wird in dieser Packungsbegleite jedoch als Cycelle bezeichnet.

• Was ist Cycelle und wofür wird es angewendet?

• Was sollten Sie vor der Anwendung von Cycelle beachten?

• Wie ist Cycelle anzuwenden?

• Welche Nebenwirkungen sind möglich?

• Was ist die Zusammensetzung von Cycelle?

• Inhalt der Packung und weitere Informationen

• Weitere Informationen

Wie Cylele eingelegt und entfernt

1. Bevor Sie den Ring einlegen, überprüfen Sie das Verfallsdatum (siehe Abschnitt 5, „Wie Cylele aufzubehalten?“).
 2. Waschen Sie sich Ihre Hände, bevor Sie den Ring einlegen oder entfernen.
 3. Wählen Sie für die Einlage die Sie bequemste Haltung, wie ein angeknütteltes Bein, knockend oder liegend.
 4. Nehmen Sie Cylele aus dem Beutel. Heben Sie den Beutel für die spätere Verwendung auf.
 5. Halten Sie den Ring zwischen Daumen und Zeigefinger fest, drücken Sie die gegenüberliegenden Seiten zusammen und legen Sie den Ring in die Scheide ein (siehe Abbildung 1–4).
- Wenn Cylele richtig eingelegt wurde, sollten Sie nichts spüren. Haben Sie das Gefühl, dass Cylele nicht richtig liegt, so schieben Sie den Ring beidseitig etwas tiefer in die Scheide. Es ist nicht wichtig, dass der Ring an einer bestimmten Stelle in der Scheide liegt.
- Nach 3 Wochen entfernen Sie Cylele aus der Scheide, indem Sie mit dem Zeigefinger in den Ring einhaken und den Ring mit zwei Fingern ergreifen und den Ring herausziehen (siehe Abbildung 5). Wenn Sie die Position des Rings in der Scheide erstattet haben, ihn jedoch nicht entfernen können, so sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.
- Der gebrauchte Ring kann, vorzugsweise im wieder verschließbaren Beutel, mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie Cylele nicht über die Toilette.



Abbildung 1 Nehmen Sie Cylele aus dem Beutel
Abbildung 2 Drücken Sie den Ring zusammen



Abbildung 3 Nehmen Sie Cylele für die Einlage des Rings eine bequeme Haltung ein



Abbildung 4A Ring eingelegt
Abbildung 4B Ring eingelegt
Abbildung 4C Ring eingelegt



Abbildung 5 Cylele aus der Scheide entfernen. Zeigefinger und Fassen mit dem Zeige- und Mittelfinger aus der Scheide entfernen

Drei Wochen Anwendung, eine Woche Pause

1. Mit Beginn der Einlage muss ein Vaginalring aufeinander folgende Wochen ununterbrochen eingelegt bleiben.
 2. Nach drei Wochen entfernen Sie den Ring an selben Wochentag und ungefähr zur gleichen Zeit, zu der Sie den Ring eingelegt haben. Zum Beispiel: Sie haben Cylele an einem Mittwoch ungefähr um 22:00 Uhr eingelegt. Dann sollten Sie Cylele drei Wochen später an einem Mittwoch ungefähr um 22:00 Uhr entfernen.
 3. Nachdem Sie den Ring entfernt haben, werden Sie eine Woche lang keinen Ring an. Während dieser Woche sollten Sie Ihre Monatsblutung bekommen. Diese beginnt gewöhnlich zwei bis drei Tage, nachdem Sie Cylele entfernt haben.
 4. Nach genau einer Woche (wieder am selben Wochentag, ungefähr zur gleichen Zeit) legen Sie einen neuen Ring an. Auch dann, wenn Ihre Monatsblutung noch anhält.
- Wenn der neue Ring mehr als drei Stunden zu spät eingelegt wird, kann die empfangnisverhütende Wirkung beeinträchtigt sein. Folgen Sie den Anweisungen in Abschnitt „Was ist zu tun, wenn Sie vergessen haben, nach der ringfreien Zeit einen neuen Ring einzulegen?“.

Wenn Sie die oben beschriebenen Anweisungen befolgen, werden Sie Ihre Monatsblutung jeden Monat ungefähr zur gleichen Zeit bekommen.

Wann wird der erste Ring eingelegt

Wenn Sie Cylele einlegen, sollten Sie keine hormonalen Verhütungsmittel angewendet haben.

Legen Sie den ersten Ring am ersten Tag Ihres Monatszyklus (d. h. am ersten Tag der Monatsblutung) ein. Cylele beginnt sofort zu wirken. Sie müssen keine anderen Verhütungsmethoden anwenden.

Wenn Sie Cylele auch an den Tagen 2-5 Ihres Monatszyklus einlegen. Allerdings sollten Sie dann während der ersten sieben Tage der Cylele-Anwendung zusätzlich ein Verhütungsmittel anwenden.

Wenn Sie vergessen haben, nach der ringfreien Zeit einen neuen Ring einzulegen

- Wenn Sie vergessen haben, nach der ringfreien Zeit einen neuen Ring einzulegen, legen Sie einen neuen Ring in die Scheide ein. Sie zusätzliche Verhütungsmethoden (wie ein Kondom für Männer), wenn Sie innerhalb der nächsten sieben Tage Geschlechtsverkehr haben. Legen Sie Cylele ein, wenn Sie innerhalb der nächsten sieben Tage Geschlechtsverkehr haben, wenn Sie Cylele einlegen, während der ringfreien Zeit.
- Die Möglichkeit, dass Sie schwanger geworden sind.** In diesem Fall kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Arzt. Je länger die ringfreie Zeit andauert, desto größer ist das Risiko, schwanger zu werden.
- Wenn Sie innerhalb der nächsten 7 Wochen eingelegt war,** ist die empfangnisverhütende Wirkung nicht beeinträchtigt. Fahren Sie mit einer ringfreien Woche fort und setzen Sie dann einen neuen Ring ein.
- Wenn Ihr Ring mehr als 4 Wochen eingelegt war,** besteht die Möglichkeit schwanger zu werden. Kontaktieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie einen neuen Ring einlegen.

Ihre Monatsblutung ausgeben

Wie Sie haben die Anwendungshinweise für Cylele genau befolgt Wenn Sie Ihre Monatsblutung ausgeben ist, ist die Anwendungshinweise für Cylele genau befolgt und keine anderen Arzneimittel eingenommen/angewendet haben, so ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie schwanger sind. Fahren Sie mit der Anwendung Ihres Rings wie gewohnt fort. Bleibe Ihre Monatsblutung jedoch zweimal hintereinander aus, so besteht die Möglichkeit, dass Sie schwanger sind. Besprechen Sie dies sofort mit Ihrem Arzt. Wenn Sie in den nächsten Ring erst an, wenn Ihr Arzt eine Schwangerschaft ausgeschlossen hat.

Sie haben die Anwendungshinweise für Cylele nicht befolgt

Wenn Ihre Monatsblutung ausgeben ist, ist die Anwendungshinweise für Cylele nicht befolgt haben und zu der erwarteten Monatsblutung in der ersten ringfreien Zeit ausbleibt, könnte es sein, dass Sie schwanger sind. Suchen Sie Ihren Arzt auf, bevor Sie einen neuen Ring einlegen.

Sie unerwartete Blutungen haben

Während der Anwendung von Cylele treten bei einigen Frauen zwischen den normalen Zeiten der Monatsblutung unerwartete Blutungen auf. Sie könnten eine kleine Menge entsprechende Hygienartikel anwenden müssen. Belasten Sie den Ring auf jeden Fall in der Scheide und setzen Sie die Anwendung wie gewohnt fort. Dauern die unregelmäßigen Blutungen an, werden sie stärker oder wiederholen sich diese, so suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

Sie den ersten Tag Ihrer Monatsblutung verschieben wollen

Wenn Sie Cylele wie vorgeschrieben anwenden, wird Ihre Monatsblutung (Abbruchblutung) in der ringfreien Woche beginnen. Wenn Sie den ersten Tag der Monatsblutung ändern wollen, so verwenden Sie ein Verhütungsmittel (wie ein Kondom) für die ringfreie Zeit.

Zum Beispiel: Beginnt Ihre Monatsblutung gewöhnlich an einem Freitag, so können Sie dies ab dem nächsten Monat auf den Dienstag (Drei Tage früher) verschieben. Sie müssen den Ring nur drei Tage früher als gewohnt einlegen.

Wenn Sie die ringfreie Zeit sehr verkürzen (z. B. drei Tage oder weniger), so kann es sein, dass Ihre erwartete Monatsblutung ausbleibt. Während der Anwendung des nächsten Rings können jedoch Schmierblutungen (Blutspuren oder Blutflecken) oder Durchbruchblutungen auftreten.

Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie vorgehen sollen.

Sie Ihre Monatsblutung verschieben wollen

Obwohl dies nicht der empfohlenen Anwendungsvorschrift entspricht, können Sie Ihre Monatsblutung (Abbruchblutung) verschieben, indem Sie die ringfreie Zeit auslassen und unmittelbar nach dem nächsten Ring einen neuen Ring einlegen.

Der neue Ring kann bis zu drei Wochen in der Scheide verbleiben. Während der Anwendung des neuen Rings können Schmierblutungen (Blutspuren oder Blutflecken) oder Durchbruchblutungen auftreten. Wenn Sie möchten, dass Ihre Monatsblutung beginnt, entfernen Sie den Ring sofort. Halten Sie die normale einwöchige ringfreie Zeit ein und legen Sie dann einen neuen Ring ein.

Wenn Ihren Arzt um Rat fragen, bevor Sie sich dazu entscheiden, Ihre Monatsblutung zu verschieben.

Wenn Sie die Anwendung von Cylele beenden wollen

Wenn Sie die Anwendung von Cylele beenden wollen, beenden Sie die Anwendung von Cylele, nachdem Sie sich entschieden haben, dass Sie nicht schwanger werden möchten, so fragen Sie Ihren Arzt nach anderen Verhütungsmethoden.

4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, insbesondere wenn diese schwerwiegend oder anhaltend sind, oder wenn sich Ihr Gesundheitszustand verändert und Sie dies auf Cylele zurückführen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

Alle Frauen, die kombinierte hormonale Kontrazeptiva anwenden, haben ein erhöhtes Risiko für Thrombose (Blutgerinnsel in den Venen (venöse Thromboembolie, VTE) oder Arterien (arterielle Thromboembolie, ATE)). Weitere Einzelheiten zu den verschiedenen Risiken im Zusammenhang mit der Anwendung kombinierter hormonaler Kontrazeptiva siehe Abschnitt 2 „Was sind die Risiken der Anwendung von Cylele beizutragen?“.

Schwerwiegende Nebenwirkungen Wenn Sie sich unverzüglich an einen Arzt, wenn bei Ihnen eines der folgenden Symptome (häufigste unbekannt) eines Angioblasten auftreten: Schwellungen des Gesichts, der Zunge oder der Extremitäten; Schwellen der Brust; Schmerzen in der Brust; Schwindel; Verwirrtheit mit Schwierigkeiten beim Atmen (siehe auch Abschnitt „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“). Treten diese Anzeichen auf, so entfernen Sie Cylele und suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

Anwenderinnen eines Ethinylestradiol/Ethinylestradiol-haltigen Rings haben folgende Nebenwirkungen berichtet:

Häufig; kann bis zu 1 von 100 Frauen betreffen

- Bluthochdruck
- Infektionen der Scheide durch Hefe-Keime („wie Soor“); Unbehagen in der Scheide aufgrund von Ringen; Juckreiz im Genitalbereich; Ausfluss aus der Scheide
- Schmerzen in der Brust; Schmerzen im Beckenbereich; verminderter Sexuallust
- Brustschmerzen; Schmerzen im Gelenk; schmerzhafte Monatsblutungen
- Ane
- Gewichtszunahme
- Der Ring wird austreten

Geltend; kann bis zu 1 von 100 Frauen betreffen

- Störung; Schwindel
- Schwindel; Schwindel; Durchfall oder Verstopfung
- Müdigkeit; Unwohlsein; Reizbarkeit; Stimmungsschwankungen; Stimmungsschwankungen
- Flüssigkeitsansammlungen im Körper (Ödem)
- Bluthochdruck; Bluthochdruck; Bluthochdruck; Bluthochdruck
- Schwierigkeiten oder Schmerzen beim Wasserlassen; verstärktes Handgriffeln; jeder in der Hand
- Probleme während des Geschlechtsverkehrs wie Schmerzen, Blutungen oder der Sexuallustspurt den Ring
- Brustschmerzen
- Appetitlosigkeit
- Rücken- oder Muskelschmerzen; Schmerzen in den Beinen oder Armen
- Herpeszoster Empfindlichkeit der Haut (Zoster)
- Brustschmerzen und Vergrößerung der Brust; fibrozytische Mastopathie (Asten in der Brust, die anschwellen oder sich vergrößern)
- Entzündung des Gebärmutterhalses; Bildung von Polymeren im Gebärmutterhals (Entzündung im Gebärmutterhals); Ausstülpung des Gebärmutterhalses (Ektropion)
- Veränderungen des Blutungszyklus (es kann z. B. zu stärkeren, längeren oder unregelmäßigen Monatsblutungen kommen oder diese können gänzlich ausbleiben); Beschwerden im Zusammenhang mit dem Gebärmutterhals (z. B. Schmerzen, Blutungen)
- Scheidenerkrankung (verursacht durch Bakterien oder Pilze); Brennen; Gieren; Schmerzen; Beschwerden oder Trockenheit in der Scheide oder den äußeren Geschlechtsstellen
- Haarausfall; Ekzeme; Juckreiz; Hautausschlag oder Hitzewallungen
- Nesselsucht

Sehr selten; kann bis zu 1 von 1.000 Frauen betreffen

- Geschlechtsspezifische Blutungen in einer Venen oder Arterie, zum Beispiel: - in der Brust (z. B. Brustarterie) - in einer Lunge (d. h. LE) - Herzinfarkt - Schlaganfall - Mini-Schlaganfall oder vorübergehende, einen Schlaganfall ähnelnde Symptome, die als transitorische ischämische Attacke (TIA) bezeichnet werden
- Blutungen in der Netzhaut des Auges, den Nieren oder dem Auge. Die Wahrscheinlichkeit für ein Bluterguss kann erhöht sein, wenn Sie an einen anderen Bluterguss leiden, wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die die Wirkung von Blutergüssen erhöhen und die Symptome eines Blutergusses sind (siehe Abschnitt 2).
- Abbruchblutungen aus der Brustdrüse

Nicht bekannt; Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

- Penischmerzen (gelblich-braune Pimplen) in der Haut, vorwiegend im Gesicht
- Chlamydien (Chlamydien) (wie Hautreize, Hautausschlag, Juckreiz) - wenn Sie eine andere Art von Unterstützung nicht entfernen (z. B. weil der Ring an der Scheidenwand anhaftet)
- vaginale Verletzung auf Grund eines gebrochenen Rings

Bei Anwenderinnen von kombinierter hormonaler Kontrazeptiva wurde über Brustkrebs und Lebertumoren berichtet. Weitere Informationen hierzu siehe Abschnitt 2, „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, Kombination“.

Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsblange angegeben sind.

Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsblange angegeben sind.

Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsblange angegeben sind.

Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsblange angegeben sind.

Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsblange angegeben sind.

Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsblange angegeben sind.

Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsblange angegeben sind.

Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsblange angegeben sind.

Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsblange angegeben sind.

Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsblange angegeben sind.

Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsblange angegeben sind.

Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsblange angegeben sind.

Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsblange angegeben sind.

Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsblange angegeben sind.

Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsblange angegeben sind.

Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsblange angegeben sind.

Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsblange angegeben sind.

6 Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Cylele enthält Die Wirkstoffe sind: Ethinylestradiol und Ethinylestradiol. Der Ring setzt über einen Zeitraum von 3 Wochen über 24 Stunden im Durchschnitt 120 Mikrogramm Ethinylestradiol und 15 Mikrogramm Ethinylestradiol frei.

Die sonstigen Bestandteile sind: Poly(ethylenglycol-vinylacetat) (7:28) (28 % Vinylacetat) und Polyurethan (ein Kunststoff, der nicht vom Körper aufgenommen wird).

Wie Cylele aussieht und Inhalt der Packung

Das Packungsblange enthält ein weißes, durchsichtiges, farbloses bis fast farbloses Ring, die Cylele ist ein biegsamer, durchsichtiger, farbloses bis fast farbloses Ring, mit einem Außendurchmesser von 54 mm und einem Querschnittsdurchmesser von 4 mm. Jeder Ring ist in einem Aluminiumbeutel verpackt. Der Beutel ist zusammen mit einer Packungsblange und Aufklebern für Ihren Kalender in einer festschließbaren Aluminium- oder Kunststoffpackung verpackt, die einen Aufkleber heben Ihnen daran zu denken, wann Sie den Ring einlegen und entfernen müssen.

Jede Falttscheitel enthält 1, 3 oder 6 Ringe/In.

Pharmazeutischer Unternehmer

Hexal AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08224) 908-0
Telefax: (08224) 908-1290
E-Mail: service@hexal.com

Hersteller

Labors des León Farmia, S.A.
C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera
24008 Navatejera
Telefon: (0924) 908-0
Telefax: (0924) 908-1290
E-Mail: service@hexal.com

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen

Oesterreich: Soloveta Vaginalring 0,120 mg/0,015 mg pro 24 Stunden - vaginales Wirkstofffreisetzungssystem
Niederlande: Cylele
Italien: Soloveta
Deutschland: Ethinylestradiol/Ethinylestradiol Sandoc 0,120 mg/0,015 mg pro 24 u, hap-müde vor vaginal gesteuert

Diese Packungsblange wurde zuletzt überarbeitet im April 2024.

Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und Hexal wünschen gute Besinnung!