

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation:

Lecicarbon® S CO₂-Laxans

Ein Zäpfchen Lecicarbon® S CO₂-Laxans enthält als

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Natriumhydrogencarbonat 125,0 mg, Natriumdihydrogenphosphat 170,0 mg

Sonstige Bestandteile:

Hartfett, (3-sn-Phosphatidyl)cholin (aus Sojabohnen), hochdisperses Siliciumdioxid

Darreichungsform und Packungsgrößen:

Packungen mit 10 Zäpfchen.

Stoff- oder Indikationsgruppe bzw. Wirkungsweise:

CO₂-Laxans.

Pharmazeutischer Unternehmer:

athenstaedt GmbH & Co KG, Bahnhofstraße 11, D-82515 Wolfratshausen
Hersteller: Haupt Pharma Livron S.A.S., 1 rue Comte de Sinard, F-26250
Livron-sur-Drôme

Anwendungsgebiete:

Zur kurzfristigen Anwendung bei verschiedenen Ursachen der Stuhlverstopfung z.B. bei schlackenarmer Kost oder mangelnder Bewegung sowie bei Erkrankungen, die eine erleichterte Stuhlentleerung erfordern.

Zur Darmentleerung bei diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen im Enddarmbereich.

Lecicarbon® kann auch zusätzlich angewendet werden, wenn vorher andere Abführmittel erfolglos genommen wurden.

Gegenanzeigen:

Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei Darmverschluss (Ileus) und bei Megakolon (krankhafte Enddarterweiterungen aus unterschiedlichen Ursachen); insbesondere bei Kindern und Säuglingen für alle Erkrankungen im Anal- und Rektalbereich, bei denen die Gefahr des übermäßigen Übertritts von Kohlendioxid in die Blutbahn besteht.

Was muss in Schwangerschaft und Stillzeit beachtet werden?

Besondere Vorsicht bei Einnahme / Anwendung von Lecicarbon® S CO₂-Laxans ist erforderlich.

Schwangerschaft

Sie dürfen Lecicarbon® S CO₂-Laxans in der Schwangerschaft nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden.

Stillzeit

Sie dürfen Lecicarbon® S CO₂-Laxans in der Stillzeit anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Nicht bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Sind keine bekannt

Dosierungsanleitung:

Soweit nicht anders verordnet, bei Bedarf ein Zäpfchen einführen, gegebenenfalls kann die Anwendung nach ca. 30 Min. bis 1 Stunde wiederholt werden.

Es stehen Zäpfchen in der Dosierung für Erwachsene, Kinder und Säuglinge zur Verfügung.

Zu beachten ist die jeweilige Zäpfchenart.

Lecicarbon® S CO₂-Laxans Zäpfchen dürfen über längere Zeit angewendet werden und führt nicht zur Gewöhnung.

Bei chronischer Verstopfung sollte jedoch in jedem Fall der Arzt zu Rate gezogen werden.

Art der Anwendung

Zäpfchen an der Perforation vom Streifen abtrennen und Laschen mit beiden Händen anfassen und auseinanderziehen!

Zäpfchen in den After einführen. Ein kurzes vorheriges Eintauchen in Wasser erleichtert das Einführen. Bei Kindern eventuell beide Gesäßhälften

zusammendrücken, um ein sofortiges Herauspressen des Zäpfchens zu vermeiden. Der Wirkungseintritt erfolgt nach 15 bis 30 Minuten.

Hinweise für den Fall der Überdosierung:

Sind keine bekannt.

Nebenwirkungen:

Sind keine bekannt.

Hinweis:

In seltenen Fällen kann das Einführen des Zäpfchens ein leichtes, schnell abklingendes Brennen verursachen.

Sollten bei der Anwendung Nebenwirkungen auftreten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis:

Nach Ablauf des Verfalldatums soll das Arzneimittel nicht mehr angewendet werden.

Nicht über 25°C aufbewahren/lagern.

Stand der Gebrauchsinformation:

September 2009

Weitere Patienteninformationen

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**Eigenschaften:**

Das Kohlendioxid (CO₂) bildet den Hauptbestandteil der gasförmigen Stoffwechselprodukte, die bei der Verdauung des Darminhaltes entstehen. Von allen Darmgasen regt es den Enddarm am intensivsten zu Bewegungen an. Lecicarbon®-Suppositorien beseitigen die Verstopfung nach dem gleichen Prinzip ausschließlich durch die Zufuhr von CO₂, das sich aus den Zäpfchen, nach dem Einführen in den Enddarm, langsam und feinperlig entwickelt. Das im Überschuß entstehende CO₂ aktiviert die Darmbewegung und löst den Entleerungsreflex im Enddarm meist innerhalb von 15 bis 30 Minuten aus.

Halten Sie sich bitte an die Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers. Das Medikament und dessen Dosierung ist auf Ihre bzw. des Kindes individuellen und momentanen Bedürfnisse abgestimmt. Damit Sie stets auf die Ihnen gegebenen wichtigen Informationen zurückgreifen können, legen Sie bitte nach der Anwendung diese Gebrauchsinformation zusammen mit den restlichen Zäpfchen wieder in die Faltschachtel zurück!

Wir wünschen eine baldige und gute Besserung!